



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

tel + 39 040 377 5551
fax + 39 040 377 5523

salute@certregione.fvg.it
salute@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Allegati: 1. Circolare Ministero Salute 03 marzo 2021 n. 8284

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE:

Trasmissione circolare Ministero Salute
03.03.2021 n. 8284 Vaccinazione dei
soggetti che hanno avuto un'infezione da
SARS-CoV-2. Criteri applicativi.

Alle Aziende ed Enti Sanitari della Regione Friuli
Venezia Giulia

Agli Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia
Giulia

Ai Medici di Medicina Generale tramite i Direttori
Sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli
Venezia Giulia

Al Servizio Farmaceutico
Direzione Centrale Salute FVG

Al Direttore del Servizio sistemi informativi e
privacy
Direzione Centrale Salute FVG

Al Direttore del Servizio Assistenza ospedaliera e
territoriale
Direzione Centrale Salute FVG

Si trasmette la Circolare del Ministero della Salute del 03 marzo 2021 con la quale si aggiornano le indicazioni per la somministrazione dei vaccini contro COVID-19/SARS CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione sintomatica o asintomatica da SAS CoV-2.

La Circolare rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di qualsiasi vaccino anti-SARS-CoV-2 ad oggi autorizzato nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Tale indicazione non si applica ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria, in cui, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili).

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei manlio.palei@regione.fvg.it

Responsabili dell'istruttoria: dott. Barbara Alessandrini mail: barbara.alessandrini@regione.fvg.it dott. Cristina Zappetti cristina.zappetti@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Al fine di applicare ai casi pratici della seduta vaccinale la Circolare, si trasmettono le seguenti indicazioni operative concordate con i Dipartimenti di Prevenzione delle A. Sanitarie regionali:

Caso A

PERSONA IMMUNOCOMPETENTE CON DOCUMENTATA INFEZIONE DA SARS CoV-2:

- Si somministra una sola dose, a 3 - 6 mesi dall'inizio della malattia, come da Circolare 3 marzo 2021.
- Se sanitario, operatore residenze per disabili o anziani, convivente con persone a rischio (es: anziani, immunocompromessi di tutte le età): viene eseguita la prima dose anche se il tempo intercorso è inferiore a 3 mesi.
- Se sanitario, operatore residenze per disabili o anziani, convivente con persone a rischio (es: anziani, immunocompromessi di tutte le età): viene eseguita anche la 2^a dose.

La persona deve presentarsi al momento della vaccinazione con il certificato di quarantena o guarigione rilasciato dal Dipartimento di prevenzione per permettere al medico vaccinatore di valutare la situazione.

Caso B

PERSONA CON IMMUNODEFICIENZA CONGENITA O ACQUISITA O ULTRAOTTANTENNE CON DOCUMENTATA INFEZIONE:

- Somministrazione 1^a dose subito dopo la negativizzazione del tampone.
- Viene eseguita anche la 2^a dose secondo la schedula vaccinale.

La persona deve presentarsi al momento della vaccinazione con il certificato di quarantena o guarigione rilasciato dal Dipartimento di prevenzione per permettere al medico vaccinatore di valutare la situazione.

Caso C

PERSONA IMMUNOCOMPETENTE CHE SI AMMALA DOPO LA PRIMA DOSE DI VACCINO:

- Si procede con la seconda dose secondo la schedula vaccinale,

Caso D

PERSONA CON IMMUNODEFICIENZA CONGENITA O ACQUISITA CHE SI AMMALA DOPO LA PRIMA DOSE DI VACCINO:

- Non si tiene conto della somministrazione della 1^o dose.

Si tratta come **Caso B** (due dosi secondo schedula vaccinale).

Si precisa che l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus non è comunemente raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Gianna ZAMARO
(firmato digitalmente)